



東方森林

Sensysoothe

舒逸丹



- 曬後修復
- 修復肌膚
- 皮膚祛紅
- 增強SPF值
- 即時緩解

### 產品資訊 Product Information

- 屬性：活性成份
- 外觀：黃色至棕黃色黏性液體
- 味道：輕微特殊氣味
- INCI Name：Butylene Glycol, Water, Sophora Flavescens Root Extract, Tribulus Terrestris Fruit Extract, Cornus Officinalis Fruit Extract
- CAS NO：107-88-0, 7732-18-5, 90131-68-3
- 建議pH值：3.2 - 6.5

### 應用特性 Formulation Characteristic

- 溶解性：水溶性
- 建議用量：0.5-5%
- 推薦應用：舒緩、修護功效產品，可應用於化妝水、精華、凝膠、乳霜等保養品，其中在水劑產品中應用時可適當添加增稠懸浮劑


### 產品介紹 Product Introduction

舒逸丹是基於皮膚泛紅的狀況，在上、下游精準**阻斷信號通路**、**抑制特異性細胞因子和介質**，關閉“**泛紅開關**”，快速解決皮膚泛紅問題的化妝品植物功效原料。針對皮膚泛紅的原理，在源頭阻斷  $Ca^{2+}$ 離子和 PI3K 雙信號通路；同時針對性抑制信號通路下游的血管舒張因子（VEGF）和特異性細胞因子、介質（PGE2等），即刻**緩解泛紅症狀**。


## 產品功效 Product efficacy

### • 舒逸丹即時舒緩皮膚泛紅


使用皮膚敏感度測試儀 ( TiVi 700 ) 收集受試者測試部位前臂內側的圖片，透過比較圖片，從而評估樣本對 DMSO 引起的皮膚刺激的舒緩效果。圖片中紅色部分越少舒緩效果越好。



用 DMSO 刺激受試者前臂內側，透過肉眼觀測，拍照評估樣本對 DMSO 引起的皮膚泛紅區域的紅斑大小的影響。使用舒逸丹後泛紅明顯減少。



紅區分析a\*值測試結果 ( n=10 )



### • 舒逸丹顯著減緩面部紅血絲

以臉部有顯著紅血絲的人群作為測，使用 VISIA CR 擷取受試者測試部位 ( 臉部 ) 的圖片，框定臉上某區域，透過 IPP 紅區分析。比較圖片和紅區，從而評估樣本對皮膚紅血絲的舒緩效果。3% 舒逸丹乳液基質半臉使用，每天2次，連續使用 2 週，面部紅血絲明顯淡化。

