

RAHN

ILLUMISCIN® GLOW

激光麥芽



- 抑制黑色素形成
- 膚色提亮
- 均勻膚色
- 舒緩泛紅

產品資訊 Product Information

- 屬性：水性活性成份
- 外觀：黃褐色液體
- 味道：特殊氣味
- INCI Name：Water, Glycerin, Pentylene Glycol, Hordeum Vulgare Extract, Citric Acid
- CAS NO：7732-18-5, 56-81-5, 5343-92-0, 85251-64-5, 5949-29-1 /77-92-9
- 通過認證：



應用特性 Formulation Characteristic


- 建議用量：1-3%
- 推薦應用：抑制黑色素生成、提亮肌膚、減緩泛紅

產品介紹 Product Introduction

ILLUMISCIN® GLOW 選用當地使用於釀酒的大麥，廢棄大麥酵母升級再造，含有**霍達汀 (hordatines)** 可阻斷影響黑色素合成元素 - 酪胺酸酶 (Tyrosinase) 的生成。此外大麥萃取物中含有植酸 (plant acid)，能夠剝奪酪胺酸酶的銅離子，影響其活性；萃取物中的天然菸鹼醯胺可抑制黑色素細胞中的黑色素體轉移至角質形成細胞。因此 ILLUMISCIN® GLOW 具有減少黑色素生成的三效作用，**有效抑制酪胺酸酶生成影響其活性、同時避免肌膚曬黑**。另外經儀器的檢驗和皮膚病學刺激性的評估顯示，ILLUMISCIN® GLOW 不僅溫和無刺激性，也為肌膚帶來**卓越的保濕度，以及柔嫩、光滑的膚觸**。


產品功效 Product efficacy

• ILLUMISCIN® GLOW 可減少臉部黑色素生成




#5, female, age 59 years, ILLUMISCIN®-GLOW 1%

黑色素減少面積




使用 ILLUMISCIN® GLOW 1% 56 天後，色素沉澱面積減少 39.1%，整體面積色素沉澱區域減少 15%，與安慰劑相比減少了2倍的暗沉面積。


• ILLUMISCIN® GLOW 可提亮臉部肌膚，不同人種的肌膚都能顯著提亮



臉部提亮面積



斑點強度明顯降低



使用 ILLUMISCIN® GLOW 1% 56 天後肌膚亮澤度達到 77%，使用 3% 56 天後斑點明顯度降低 13%。不同人種使用 56 天後，也均有明顯的膚色提亮與淡斑效果。